

# Őszi muskátli-praktikák

Kertészeti áruházakban történt felmérések szerint idén is a legnépszerűbb cserépes növény a muskátli volt. Minden háztartásban van tehát legalább néhány muskátli tő, amely így a nyár végén sorsára vár. Van, aki az első fagyok után egyszerűen kidobja, és tavasszal új töveket vásárol.

**K**ertészként én is ennek a megoldásnak vagyok a híve. De emlékszem, gyerekkoromban a nagymamám a kamrában szögre akasztotta a cserépből kiütött és újságpapírba csavart álló muskátli töveket. Aztán tavasszal friss földbe elültette és gyönyörűen virágzott neki... Ó, azok a nagymamás praktikák...! Tudom, idén is sokan próbálják majd átteleltetni a muskátlikat. Most nekik gyűjtöttem pár teletelési tanácsot.

A legfontosabb szabály, hogy csak egészséges tövek teletetésével próbálkozzunk, a fertőzötteket még ősszel dobjuk ki, be se vigyük a teletető helyre. Télen ugyanis a közelükben levő egészséges példányokat is megfertőzhetik. Szeptembertől a kevesebb napfény és a csökkentett tápoldatozás készíti fel a növényeket a téli időszakra. A fagypont körüli éjszakai hőmérséklet jelzi a teletetés kezdetét. Mielőtt teletető helyre viszük, tisztítsuk meg a töveket az elszáradt levelektől, és elnyílt virágoktól. A hajtásokat vágjuk vissza felére-harmadára. A teletetőhely hőmérséklete 5-10 °C körül legyen. Ritkítsuk az öntözést, és egyáltalán ne tápoldatozzunk. Elegen-

dő, ha a növény kéthetente kap vizet. Ha a kevés fényben túl nedves lesz a közeg, a pihenő időszak megszakad és hosszú, vékony betegségre fogékony hajtásokat hoz a muskátli. A tél folyamán majd rendszeresen ellenőrizzük a tövek egészségét. Szedjük le az elszáradt leveleket, és dobjuk ki az esetlegesen megbetegedett növényeket. Még nem késő házi szaporításukkal próbálkozni. Az idős tövekről kb. 8-10 cm-es részeket vágjunk, a dugványok tetején 4 levelet hagyjunk, az alján kb. 4 cm hosszú, levelektől megtisztított hajtásrészt készítsünk és ezt dugjuk a gyökeretető közegbe, mely lehet nedvesített homok vagy finom sóder. Az első 1-2 héten húzzunk egy átlátszó nylon zacskót a dugványainkra, így tudunk nekik elegendő páratartalmat biztosítani.



A gyökeresedéshez legalább állandó 20-22°C-ra van szükség. 2-3 hét elmúltával a zacskót levehetjük a dugványainkról, ám a talajt továbbra se hagyjuk kiszáradni. A begyökeresedett növényeinket hajtásvégeit csípjük vissza,

hogy a tő megfelelően elágazódjon. Dugványaink további fejlődéséhez elegendő télen a 10-15°C körüli hőmérséklet. Ha télen megnyúlnának, ez csakis a magas hőmérséklet, kevés fény együtteséből adódhat. Február végén, március elején vágjuk vissza a megnyúlt hajtásrészeket. Ekkor óvatosan megkezdhetjük a tápoldatozást is, először magasabb nitrogén tartalmú tápoldattal.

KLEMENTISZ ÁGNES - [www.evelopark.hu](http://www.evelopark.hu)

